


## NAVODILO ZA PRIPRAVO PACIENTA ZA ANALIZO *pregled perianalnega celofanskega brisa na jajčeca podančič (oxyuris)*

Jajčeca podančič (*Enterobius vermicularis/Oxyuris vermicularis*) dokazujemo s perianalnim celofanskim brisom, ker se jajčeca parazita ne izločajo z blatom. Samica parazita leže jajčeca v toplo in vlažno kožo perianalnih gub, kar povzroča srbenje. Odlaganje jajčec se običajno dogaja ponoči. **JAJČECA SE PRILEPIJO NA KOŽO OKOLI ZADNJIKA.** Dokažemo jih s pomočjo celofanskega brisa z lepilnim trakom (selotejp) perianalnega področja.

### ODVZEM brisa anusa

- V laboratoriju ste prejeli navodila skupaj z objektnim stekelcem z nalepljenim prozornim lepilnim trakom (selotejpom).
- Zvečer ritko umijete in osušite. Kože ritke ne namažete s kremo.
- Bris odvezmete **zjutraj, pred uriniranjem ali iztrebljanjem in brez predhodnega umivanja.**
- Odlepate trak selotejpa v dolžini stekelca, odmaknete ritnici in ga z lepljivo stranjo pritisnete na anus in kožo okrog anusa (slika 1).
- Trak ponovno nalepite na objektno stekelce tako, da je med površino predmetnega stekelca in selotejpa čim manj mehurčkov zraka (slika 2).
- Pri pravilnem odvzemu bomo videli na stekelcu odtis anusa v obliki rozete (slika 3).



**Sprejem materiala:** pon. – pet. od 7.00 do 13.30 ure (LABORATORIJ ZD ŽALEC)  
torek, petek od 7.00 do 9.00 ure (LABORATORIJ ZP VRANSKO)

---